

云南省人民政府食品安全委员会办公室

云南省人民政府食品安全委员会办公室 关于印发白酒消费安全风险预警信息的通知

各州、市政府食品安全办：

现将《白酒消费安全风险预警信息》印发你们，请立即发布，提醒广大人民群众通过合法渠道购买白酒，适度饮酒，提高自我防范能力。

云南省人民政府食品安全委员会办公室

2021年10月24日



（联系人及电话：尹浩璇 0871-64566115）

（此件公开发布）

白酒消费安全风险预警信息

进入秋冬季节，正值白酒消费的高峰期，为提高自我防范能力，切实保障广大人民群众身体健康和生命安全，云南省人民政府食品安全办提醒大家：

一、通过合法渠道购买白酒，选购正规厂家生产的预包装食品，查看标签内容是否齐全，并索取票据。

二、不要购买无产品标识、无生产厂家、无生产地址的散装白酒。不要购买、饮用私自勾兑和来源不明的散装白酒。家庭自酿白酒严禁对外出售。

三、白酒生产经营者要树立责任意识和诚信意识，严格落实食品安全主体责任，依法严格执行质量安全控制体系，遵守进货查验、生产经营记录、过程控制、检验检测和自查自纠等制度。

四、白酒生产经营者严禁购买、贮存和使用甲醇、工业酒精等非食品原料。使用醇基液体燃料的各类餐饮服务单位，要加强使用环节管理，专人专位管理存放，标贴明显标识，做好领用登记，严禁同白酒混合存放。

五、严格农村集体聚餐备案管理，严禁在集体聚餐中提供家庭自酿酒或散装储藏酒。

六、积极倡导健康饮酒、文明饮酒风气。饮酒后如果出现身体不适要及时就医治疗。

七、各级市场监管部门正在全省开展散装白酒质量安全专项整治行动，加大对白酒生产、流通领域的监管力度，坚决打击白酒制假造假等违法行为。鼓励人民群众和社会各界积极拨打 12315，投诉举报白酒生产经营违法违规行为。

温馨提示

1. 甲醇是工业酒精的主要成分之一。摄入 5 至 10 毫升就可引起中毒，30 毫升可致死，且其轻度中毒反应和普通醉酒类似，工业酒精和食用白酒难以直观区分。甲醇对人体的毒性作用，主要特征是以中枢神经系统损伤、眼部损伤及代谢性酸中毒为主。一般于口服后 8 至 36 小时发病，表现为头痛、头晕、乏力、步态不稳、嗜睡等。重者有意识朦胧、谵妄、癫痫样抽搐、昏迷、死亡等。

2. 适量饮酒、不要酗酒。推荐标准：女性每天红酒 $\leq 150\text{ml}$ 、啤酒 $\leq 350\text{ml}$ 、白酒 $\leq 45\text{ml}$ ；男性每天红酒 $\leq 300\text{ml}$ 、啤酒 $\leq 700\text{ml}$ 、白酒 $\leq 90\text{ml}$ ；若饮酒过量，可大量饮用糖水、蜂蜜水，保护肝脏，加速酒精代谢。

3. 有肝功能不全、胃炎、胃或十二指肠溃疡、食道炎、口腔溃疡、高血压、心脏病、甲状腺疾病、牙龈敏感、松动、肾功能不全、肾小球肾炎的人，不适合饮酒。

4. 正在服用头孢类抗生素或者高血压、高血糖药物、甲亢药物等的患者要绝对禁止饮酒。

真伪酒的识别方法

1. 看印刷。真酒标签的印刷十分讲究，纸质精良白净，字体规范清晰，色泽鲜艳均匀，图案套色准确，油墨线条不重叠，如有英文或拼音字母，则大小规范一致。

2. 看瓶盖。目前我国有17种国家公布认可的名白酒的瓶盖，大都使用铝制金属防盗盖，其特点是盖体光滑、形状统一、开启方便，盖上图案及文字整齐清楚，对口严密。

3. 看包装。真酒的纸盒包装除印刷精美之外，其边缘接缝齐整严密，没有松紧不匀、留缝隙的现象。

4. 看清浊。透过玻璃瓶从外观上看，白酒是绝对清澈透明的，而且没有沉淀。

5. 闻香味。饮用白酒前，倒少许酒洒在手上，两手摩擦使酒发热，然后闻其香味。一般来说，如果气味苦臭或异常，很有可能为假劣酒。